



INSECTICIDA AGRÍCOLA  
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)  
No. Registro Nacional ICA: PL0014102023  
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



# ABASAC® 1.8 EC

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### INGREDIENTE ACTIVO

Abamectina:..... 18 g/L

Ingredientes aditivos: ..... c.s.p. 1 Litro

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**ABASAC 1.8 EC**, insecticida-acaricida biológico, de origen natural, producido por el microorganismo del suelo (*Streptomyces avermitilis*), de largo efecto residual y altamente efectivo en el control de ácaros, minadores de hoja, mosca blanca, thrips en frutales – ornamentales y demás cultivos.

### TABLA DE USOS REGISTRADOS

| CULTIVOS                                     | BLANCO BIOLÓGICO                               | DOSIS                  | P.C. (Días) | P.R. (Horas) |
|--|--|------------------------|-------------|--------------|
| ROSA ( <i>Rosa sp.</i> )                     | Ácaros<br>( <i>Tetranychus urticae</i> )       | 0.30 – 0.35 cc/L       | N.A         |              |
| TOMATE<br>( <i>Lycopersicon esculentum</i> ) | Cogollero<br>( <i>Scrobipalpus absoluta</i> )  | 0.25 L/Ha              | 12          | 4            |
| LIMÓN<br>( <i>Citrus aurantifolia</i> )      | Ácaros<br>( <i>Polyphagotarsonemus latus</i> ) | 0.8 L/Ha<br>(0.5 cc/L) | 7           |              |
| AGUACATE<br>( <i>Persea americana</i> )      | Ácaros<br>( <i>Oligonychus sp.</i> )           | 100 cc/200L            | 14          |              |

P.C. Periodo de carencia: Tiempo entre la última aplicación y la cosecha.

P.R. Periodo de reingreso: Periodo restringido (no prohibido) entre la aplicación y la reentrada del personal al área aplicada (ver tiempo en cuadro).

### FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN



**ABASAC 1.8 EC** debe ser aplicado con la dosis recomendada al momento en que se observen los primeros individuos de la plaga a controlar.

**ABASAC 1.8 EC** puede ser incluido dentro de un programa de rotación para el control de plagas, la rotación a utilizar debe contemplar diferentes mecanismos y/o modos de acción para no generar resistencia de la plaga a los ingredientes activos de los productos a utilizar.

### MODO DE APLICACIÓN

Para la preparación de la mezcla se recomienda llenar con agua el tanque del equipo a utilizar con la mitad del volumen, luego colocar el agitador en marcha y agregar la dosis requerida de **ABASAC 1.8 EC** hasta obtener una mezcla homogénea y estable, finalmente completar con agua hasta el volumen deseado.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II  
MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



INSECTICIDA AGRÍCOLA  
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)  
No. Registro Nacional ICA: PL0014102023  
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



# ABASAC® 1.8 EC

## COMPATIBILIDAD



**ABASAC 1.8 EC** es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola, si es utilizado bajo las recomendaciones de la etiqueta, sin embargo, se recomienda antes de efectuar mezclas, realizar previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

## EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS

Los residuos del producto ABASAC 1.8 EC no afectan los cultivos siguientes dentro de una rotación, si se siguen las recomendaciones y se aplican las dosis de la etiqueta.

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- No almacene ni transporte junto con alimentos, bebidas, ropa, agua o medicamentos de consumo humano o animal. Evite el contacto del producto con el fuego.
- Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

## PRESENTACIONES

1L

## FITOTOXICIDAD

**ABASAC 1.8 EC** es bien tolerado por los cultivos mencionados siempre y cuando se aplique acorde con las recomendaciones de uso.



## EQUIPOS DE APLICACIÓN Y SU CALIBRACIÓN

**ABASAC 1.8 EC** Se puede aplicar con los equipos convencionales que existen regularmente en las fincas. Recuerde utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurar que la aplicación se realice uniformemente. Verificar la calibración de los equipos y recordar que esta se hace más crítica al disminuir el volumen de aguas empleado por hectáreas. Se aplica por aspersión foliar. Los equipos y los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”**  
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS”  
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES LOS EMPAQUES DESOCUPADOS Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELOS O PERFÓRELOS PARA EVITAR SU REUSO Y ELIMINE SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD LOCAL.



**EN CASO DE INTOXICACIÓN, COMUNÍQUESE CON CISPROQUIM:**  
Línea 01 8000 916012  
(fuera de Bogotá)  
o en Bogotá al teléfono  
(601) 2886012. Atención 24 horas.

