



FUNGICIDA AGRÍCOLA  
POLVO MOJABLE (WP)  
Reg. Nacional ICA No. 1162  
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



# ALTAIR WP

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### INGREDIENTE ACTIVO

Metalaxil:.....150 g/Kg  
Oxicloruro de Cobre:.....350 g/Kg

Ingredientes aditivos: ..... c.s.p. 1 Kg

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**ALTAIR WP** es un fungicida cuya acción previene, cura y erradica enfermedades causadas por hongos, de tipo oomycetos. **ALTAIR WP** actúa por contacto y posee alta sistemicidad. El oxicloruro de cobre es un compuesto inorgánico que posee actividad protectante de contacto multi-sitio. Su acción fungicida es de amplio espectro. El metalaxil es absorbido rápidamente por la planta. **ALTAIR WP** se mueve hacia arriba por el xilema y se distribuye en toda la planta, de esta manera controla los hongos y protege los nuevos brotes luego de la aplicación. Inhibe la síntesis de ácidos nucleico.

### TABLA DE USOS REGISTRADOS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C. (Días)	P.R. (Horas)
TOMATE	Gota ( <i>Phytophthora infestans</i> )	2,5 Kg/Ha	7	4
LULO				
PIMENTÓN				
TOMATE DE ÁRBOL				
BERENJENA				
UCHUVA				
AJÍ				
AJÍ DULCE				
ROSA	Mildeo veloso ( <i>Peronospora sparsa</i> )	1,5 g/L	N.A.	
PAPA	Gota ( <i>Phytophthora infestans</i> )	1,5 kg/Ha	14	
PIÑA ( <i>Ananas comosus</i> )	Podrición del cogollo ( <i>Phytophthora parasitica</i> )	2,5 g/L	21	
AGUACATE	Tristeza del aguacate ( <i>Phytophthora cinammomi</i> )	3,0 g/L	30	
CEBOLLA	Mildeo veloso ( <i>Peronospora destructor</i> )	0,6 kg/Ha	7	
LIMÓN	Podredumbre del cuello - <i>Gomosis</i> ( <i>Phytophthora sp.</i> )	3,0 g/L	14	

P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Periodo de Reingreso: Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área tratada.

N.A.: No aplica



### FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Aplicar **ALTAIR WP** en forma preventiva o con el comienzo de los primeros síntomas de la enfermedad a intervalos de 7 a 10 días. En cultivos de tomate realizar máximo tres (3) aplicaciones durante el ciclo del cultivo. Realizar las aspersiones dirigidas al patio de infección. Intercalar con fungicidas de diferente modo de acción.

### MODO DE APLICACIÓN

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que se va a utilizar, agregar la dosis requerida de **ALTAIR WP** luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

### EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Puede aplicar con los equipos convencionales. Para óptima distribución, utilizar boquillas de cono hueco y aplicar un volumen de 600 litros de agua por hectárea. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III**  
**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



FUNGICIDA AGRÍCOLA  
POLVO MOJABLE (WP)  
Reg. Nacional ICA No. 1162  
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



# ALTAIR WP

## EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS

No afecta los cultivos siguientes dentro de una rotación si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

## COMPATIBILIDAD



No recomendable mezclar con otro plaguicida o fertilizante. La compañía no se responsabiliza por mezclas no recomendadas en esta etiqueta.

## FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para las plantas si se siguen las instrucciones de uso.



## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

### PRIMEROS AUXILIOS:

- Contacto con la piel y la ropa: Quite la ropa y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón por 20 minutos.
- Contacto con los ojos: Lave inmediatamente los ojos contaminados con abundante agua durante 10 a 15 minutos.
- En caso de inhalación, el paciente debe trasladarse a un lugar aireado.
- NO PROVOCAR VOMITO, si el paciente está consciente administre una taza de agua. Trasladar en forma inmediata a un centro asistencial.

## ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO

El antídoto específico es la d-Penicilamina.

## PRESENTACIONES

250gr - 500gr - 1Kg



**EN CASO DE INTOXICACIÓN,  
COMUNÍQUESE CON CISPROQUIM:  
Línea 01 8000 916012 (fuera de Bogotá)  
o en Bogotá al teléfono (601) 2886012.  
Atención 24 horas.**

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE  
CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

