FUNGICIDAS

FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)
No. Reg. Nacional ICA: PL0002372024
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.

anasac COLOMBIA

ALTAIR WP

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO

Metalaxil:.....150 g/Kg
Oxicloruro de Cobre:.....350 g/Kg

Ingredientes aditivos: ..... c.s.p. 1 Kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ALTAIR WP es un fungicida cuya acción previene, cura y erradica enfermedades causadas por hongos, de tipo oomycetos. **ALTAIR WP** actúa por contacto y posee alta sistemicidad. El oxicloruro de cobre es un compuesto inorgánico que posee actividad protectante de contacto multi-sitio. Su acción fungicida es de amplio espectro. El metalaxil es absorbido rápidamente por la planta. **ALTAIR WP** se mueve hacia arriba por el xilema y se distribuye en toda la planta, de esta manera controla los hongos y protege los nuevos brotes luego de la aplicación. Inhibe la síntesis de ácidos nucleico.

TABLA DE USOS REGISTRADOS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C. (Días)	P.R. (Horas)
TOMATE	Gota *(Phytophthora infestans)*	2,5 Kg/Ha	7	4
LULO				
PIMENTÓN				
TOMATE DE ÁRBOL				
BERENJENA				
UCHUVA				
AJÍ				
AJÍ DULCE				
ROSA	Mildeo velloso *(Peronospora sparsa)*	1.5 g/L	N.A.	
PAPA	Gota *(Phytophthora infestans)*	1.5 kg/Ha	14	
PIÑA *(Ananas comosus)*	Podrición del cogollo (*Phytophthora parasitica)*	2.5 g/L	21	
AGUACATE	Tristeza del aguacate *(Phytophthora cinammomi)*	3,0 g/L	30	
CEBOLLA	Mildeo velloso *(Peronospora destructor)*	0.6 kg/Ha	7	
LIMÓN	Podredumbre del cuello – *Gomosis (Phytophthora sp.)*	3.0 g/L	14	
PALMA DE ACEITE *(Elaeis guineensis)*	Pudrición de Cogollo (PC) - *(Phytophthora palmivora)*	2.5 g/L	N.A.	

P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
P.R.: Periodo de Reingreso: Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área tratada.
N.A.: No aplica

FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Aplicar **ALTAIR WP** en forma preventiva o con el comienzo de los primeros síntomas de la enfermedad a intervalos de 7 a 10 días. En cultivos de tomate realizar máximo tres (3) aplicaciones durante el ciclo del cultivo. Realizar las aspersiones dirigidas al patio de infección. Intercalar con fungicidas de diferente modo de acción.

MODO DE APLICACIÓN

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que se va a utilizar, agregar la dosis requerida de ALTAIR WP luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante. Aguacate, Limón: Realizar aplicación en drench iniciada la etapa de vivero; volumen de aplicación en drench de 1L/Plántula realizando una previa calibración del equipo de fumigación. Cebolla, Papa, Tomate: volumen de aplicación de 600 L/Ha realizado una previa calibración del equipo de fumigación. Piña: volumen de aplicación 250 cc/planta realizada una previa calibración del equipo de fumigación. Palma de aceite: Se recomienda aplicar el producto de manera preventiva usando de 300 a 500 cc agua/palma, realizando una previa calibración del equipo de fumigación. En todos los casos garantizar una buena agitación de la mezcla.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

FUNGICIDAS

FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)
No. Reg. Nacional ICA: PL0002372024
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.

anasac COLOMBIA

ALTAIR WP

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Puede aplicar con los equipos convencionales. Para óptima distribución, utilizar boquillas de cono hueco y aplicar un volumen de 600 litros de agua por hectárea. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto.

EFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS

No afecta los cultivos siguientes dentro de una rotación si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

No recomendable mezclar con otro plaguicida o fertilizante.
La compañía no se responsabiliza por mezclas no recomendadas en esta etiqueta.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para las plantas si se siguen las instrucciones de uso.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

PRIMEROS AUXILIOS:

- Contacto con la piel y la ropa: Quite la ropa y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón por 20 minutos.
- Contacto con los ojos: Lave inmediatamente los ojos contaminados con abundante agua durante 10 a 15 minutos.
- En caso de inhalación, el paciente debe trasladarse a un lugar aireado.
- NO PROVOCAR VOMITO, si el paciente está consciente administre una taza de agua. Trasladar en forma inmediata a un centro asistencial.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, COMUNÍQUESE CON CISPROQUIM:
Línea 01 8000 916012 (fuera de Bogotá) o en Bogotá al teléfono (601) 2886012.
Atención 24 horas.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO

El antídoto específico es la d-Penicilamina.

PRESENTACIONES

250gr - 500gr - 1Kg

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

IDA17022025