FUNGICIDAS

FUNGICIDA AGRÍCOLA
EMULSIÓN CONCENTRADA (EC)
Registro Nacional ICA No. PL0015382023
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.

anasac COLOMBIA

# CANCILLER

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### INGREDIENTE ACTIVO

Difenoconazole:.....250 g/L

Ingredientes aditivos: ..... c.s.p. 1 Litro

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**CANCILLER EC** es un fungicida sistémico translaminar y de contacto con acción preventiva y curativa sobre una amplia gama de hongos superiores. Pertenece al grupo de los triazoles, inhibiendo de la síntesis del ergosterol en la membrana celular de los hongos. Altamente eficaz acción sobre hongos, rápida absorción y translocación, posee acción preventiva y curativa, aplicado en las dosis recomendadas.

### TABLA DE USOS REGISTRADOS

| CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO | DOSIS* | P.C. (Días) | P.R. (Horas) |
|---|---|---|---|---|
| ARROZ *(Oryza sativa)* | Helmintosporiosis *(Helminthosporium oryzae)* | 400 cc/Ha | 15 | 4 |
| CEBOLLA *(Allium cepa)* | Mancha purpura *(Alternaria porri)* | 400 cc/Ha | 14 | |
| CLAVEL *(Dianthus caryophyllus)* | Mancha anillada *(Cladosporium echinulatum)* | 0.8 cc/L | N.A. | |
| FRESA *(Fragaria sp.)* | Antracnosis *(Colletotrichum sp.)* | 0.5 L/Ha | 14 | |
| ARANDANO ALTO *(Vaccinium cosybosum)*<br>ARANDANO OJO DE CONEJO *(Vaccinium ashei)*<br>ARANDANO CRANBERRY *(Vaccinium macrocarpon)* | Antracnosis *(Colletotrichum sp.)* | 0.5 L/Ha | 14 | |
| HABICHUELA *(Phaseolus vulgaris)* | Mancha anillada *(Ascochyta phaseolorum)* | 0.5 L/Ha | 7 | |
| ROSA *(Rosa sp.)* | Mildeo polvoso *(Sphaerotheca pannosa)* | 0.66 cc/L | N.A. | |
| TOMATE *(Solanum lycopersicum)* | Tizón temprano *(Alternaria solani)* | 400 cc/L | 7 | |
| TOMATE DE ÁRBOL *(Solanum betaceum)* | Antracnosis *(Colletotrichum gloeosporoides)* | 0.25 cc/L | 7 | |

***VOLUMEN DE APLICACIÓN:**
**Arroz 200L/Ha, Fresa 400L/Ha, Cebolla/Tomate/Habichuela 600L/Ha, Rosa/Clavel 1000L/Ha.**

**P.C.: Intervalo (días) entre la última aplicación y la cosecha.**
**N.A.: No aplica.**
**P.R.: Tiempo (horas) entre la aplicación del producto y la entrada del personal a cultivo. Tiempo aproximado necesario para que se seque el producto.**

### FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Aplicar **CANCILLER EC** con el comienzo de los primeros síntomas de la enfermedad a intervalos de 10 a 15 días. Realizar máximo tres (3) aplicaciones durante el ciclo del cultivo. Realizar las aspersiones dirigidas al patio de infección.

**CANCILLER EC** puede ser incluido dentro de un plan de rotación con fungicidas que tengan diferente modo y/o mecanismo de acción para evitar resistencia de la enfermedad al ingrediente activo. No aplicar con temperaturas altas.

Rotar con fungicidas de diferente mecanismo y/o modo de acción.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II**
**MODERADAMENTE PELIGROSO**
**DAÑINO**

FUNGICIDAS

FUNGICIDA AGRÍCOLA
EMULSIÓN CONCENTRADA (EC)
Registro Nacional ICA No. PL0015382023
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.

anasac COLOMBIA

# CANCILLER

## COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de productos de uso agrícola, y no existe restricciones conocidas hasta la fecha si es utilizado a la dosis de etiqueta, sin embargo se recomienda antes de efectuar mezclas realizar previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.




## EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

**CANCILLER EC** se puede aplicar con los equipos convencionales. Para óptima distribución, utilizar boquillas de cono hueco. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto.

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- No almacene ni transporte junto con alimentos, bebidas, ropa, agua o medicamentos de consumo humano o animal. Evite el contacto del producto con el fuego.
- Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, COMUNÍQUESE CON CISPROQUIM: Línea 01 8000 916012 (fuera de Bogotá) o en Bogotá al teléfono (601) 2886012. Atención 24 horas.**

## FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para las plantas si se siguen las instrucciones de uso.

## MODO DE APLICACIÓN

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que se va a utilizar, agregar la dosis requerida de **CANCILLER EC** luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

## EFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS

No afecta los cultivos siguientes dentro de una rotación si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

**ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"**
**"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS"**
**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES LOS EMPAQUES DESOCUPADOS Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELOS O PERFÓRELOS PARA EVITAR SU REUSO Y ELIMINE SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD LOCAL.**

**"ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

## PRESENTACIONES

250cc - 1L



IDA05062025



**Anasac Colombia** Km 1.5 Via Funza Siberia Parque Ind. San Diego Bodega C14 Funza / Cundinamarca / Colombia