



INSECTICIDA AGRÍCOLA  
SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLAS (FS)  
No. Registro Nacional ICA: 403  
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



**anasac**  
COLOMBIA

# CIGARAL® 600 FS

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### INGREDIENTE ACTIVO

Imidacloprid.....600 g/L    Ingredientes aditivos:..... c.s.p 1 Litro

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**CIGARAL® 600 FS** es un producto ligeramente peligroso. Se recomienda observar todas las precauciones necesarias en el manejo de plaguicidas.

Mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas.

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel o los ojos y la contaminación de los alimentos.

Este insecticida no debe aplicarse cuando exista riesgo de contaminación sobre alimentos de consumo humano o animal o fuentes de agua.

Efectuar diluciones de este producto al aire libre y “No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

Durante las aplicaciones de **CIGARAL® 600 FS** “Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas” además los operarios deben usar equipo de protección completo: ropa de trabajo en algodón o fibras sintéticas, guantes de goma, botas de caucho o PVC, gafas de seguridad contra impactos o careta y respirador para polvos tóxicos. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión. “Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada bññese con abundante agua y jabón”. No reusar prendas ni el equipo de seguridad sin haber sido lavados y revisados previamente.  
“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

### TABLA DE USOS REGISTRADOS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C. (Días)	P.R. (Horas)
ARROZ ( <i>Oryza sativa</i> )	Sogata ( <i>Tagosodes oriziclus</i> )	100 ml/100 kg de semilla: Por cada 100 kg de semilla, aplicar la dosis en 1.5 litros de agua para humedecer uniformemente la semilla, usando equipos especiales para tal tratamiento	N.A.	0

P.C.: Período de carencia: Días entre la última aplicación y la cosecha: No aplica por método y época de aplicación.

P.R.: Período de reentrada: No aplica por método y época de aplicación.



### FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Se hace una aplicación sobre las semillas en el mezclador adaptado para su impregnación.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III  
LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



INSECTICIDA AGRÍCOLA  
SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLAS (FS)  
No. Registro Nacional ICA: 403  
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



# CIGARAL® 600 FS

## EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Diluir la dosis de **CIGARAL® 600 FS**, en 1.5 litros de agua, agitando hasta que la dilución sea homogénea. Hacer una aplicación sobre las semillas, en el mezclador adaptado para la impregnación de las mismas, confirmando visualmente por el color del insecticida, que la Uniformidad y cobertura sean las mejores. Asegurarse que las semillas queden completamente impregnadas con la mezcla.

## COMPATIBILIDAD



En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer pruebas de fitocompatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.

## FITOTOXICIDAD

**CIGARAL® 600 FS** no afecta el poder germinativo de la semilla, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.



## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la Etiqueta o la hoja informativa adjunta".
- **Contacto dérmico:** Retirar las prendas contaminadas y lavar las áreas afectadas de la piel con abundante agua y jabón. Si aparece irritación y persiste, consultar a un especialista.
- **Contacto ocular:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia por al menos quince minutos, manteniendo los párpados abiertos durante el lavado. Si aparece irritación, y persiste, consultar inmediatamente un médico.
- **Inhalación:** Alejar la persona afectada de la zona de trabajo, colocándola en lugar bien ventilado y protegiéndola del frío. Si hay dificultad o molestias respiratorias, suministrar oxígeno y llamar inmediatamente al médico.

En caso de ingestión: En caso de ingestión accidental y si el paciente está consciente, provocar el vómito con agua tibia. Buscar atención médica inmediata. Nunca suministrar nada a una persona que se encuentre inconsciente. Guía para el médico: En caso de ingestión, se recomienda suministrar carbón activado y purgante salino (no oleoso) como sulfato de sodio (30 g).

Mantener el paciente en reposo hasta la llegada del médico.

Antídoto: No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Posibles síntomas: Apatía, depresión del tono muscular, calambres, temblores y trastornos respiratorios.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Prácticamente no tóxico para peces y otros organismos acuáticos. Producto moderadamente tóxico para las aves. No exponer semillas tratadas al consumo de las aves. Por su modo de aplicación, no presenta riesgos para las abejas.
- En caso de derrame recoger el producto con tierra o arena y carbonato de sodio. Barrer y recoger el producto en un contenedor bien identificado para ser luego transportado a la planta de tratamiento para su eliminación final. Evite contaminar con **CIGARAL® 600 FS** las fuentes de agua que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.
- Para su aplicación en zonas rurales se debe mantener la franja de seguridad de 10 metros en aplicaciones terrestres y de 100 metros, en relación con cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal u otra área que requiera de protección especial, con el fin de minimizar posibles efectos adversos al ambiente.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III  
LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



INSECTICIDA AGRÍCOLA  
SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLAS (FS)  
No. Registro Nacional ICA: 403  
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



# CIGARAL® 600 FS

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**CIGARAL® 600 FS** es un insecticida sistémico que actúa por ingestión y contacto, a base de Imidacloprid al 60%, en presentación de suspensión concentrada para tratamiento de semilla (control de las plagas en forma temprana desde el arranque, antes de la siembra), apropiado para el control de Sogata (*Tagosodes orizicolus*) en el cultivo del arroz. La semilla que se destina al tratamiento con **CIGARAL® 600 FS** debe ser previamente ventilada para la eliminación de restos vegetales, polvo, etc.



**EN CASO DE INTOXICACIÓN,  
COMUNÍQUESE  
CON CISPROQUIM:  
Línea 01 8000 916012  
(fuera de Bogotá)  
o en Bogotá al teléfono  
(601) 2886012. Atención 24 horas.**

**ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO  
PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR  
ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"  
"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y  
ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS"  
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES  
LOS EMPAQUES DESOCUPADOS Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN  
LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELOS O  
PERFÓRELOS PARA EVITAR SU REUSO Y ELIMINE  
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA  
AUTORIDAD LOCAL.**

## PRESENTACIONES

1L

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- No almacene ni transporte junto con alimentos, bebidas, ropa, agua o medicamentos de consumo humano o animal. Evite el contacto del producto con el fuego.
- Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.

**"ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE  
CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

