



FUNGICIDA AGRÍCOLA
EMULSION CONCENTRADA (EC)
No. Registro Nacional ICA: PL0001582024
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



ESTRUENDO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO

Miclobutanil:.....240 g/L

Ingredientes aditivos:.....c.s.p 1 Litro.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESTRUENDO EC es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Es absorbido rápidamente por la planta, protegiendo los brotes nuevos. Actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol lo que provoca la muerte del hongo hasta 4 días después de haberse iniciado la infección.

TABLA DE USOS REGISTRADOS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C. (Días)	P.R. (Horas)
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	Mal del pie (<i>Gaeumannomyces graminis</i>)	150 cc/Ha	7	4
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	PUDRICIÓN DE LA VAINA (<i>Sarocladium oryzae</i>)	140 cc/Ha		
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	Helminthosporium (<i>Helminthosporium oryzae</i>)	85 cc/Ha		
BANANO (<i>Musa paradisiaca</i>). Poscosecha	Pudrición de la corona (<i>Fusarium roseum</i> , <i>Lasioidiplodia theobromae</i> , <i>Verticillium theobromae</i> , <i>Colletotrichum musae</i>)	333 cc / 200 L o 1665 cc/L	N/A*	4
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	ALTERNARIA AMARILLERA O MANCHA PÚPURA (<i>Alternaria porri</i>)	250 cc/Ha	3	
TOMATE (<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill)	TIZON TEMPRANO (<i>Alternaria solani</i>)	0.4 L/Ha	12	
ROSA	MILDEO POLVOSO (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	25 cc/100 L agua	N/A	

P.C: Periodo de Carencia: Intervalo de días entre la última aplicación y la cosecha (días).

P.R: Periodo de reentrada: Horas transcurridas entre la última aplicación y la entrada del personal al área tratada.

Para Banano: * Ingresar al cultivo dos (2) horas después de la última aplicación del plaguicida, con autorización previa del Ingeniero Agrónomo, verificando que la superficie este seca y utilizando los elementos de protección indicados.

N.A: No Aplica. * En banano no aplica por ser un producto aplicado al fruto antes de empacar.

** La concentración del IA (ppm) a aplicar, está directamente relacionada con el mercado destino y su tiempo de transporte. Banano (400 ppm).

FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

ESTRUENDO EC se utiliza dependiendo de las condiciones ambientales y de la aparición de las enfermedades.

EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS

En diferentes estudios de campo, se ha demostrado que los residuos presentes en el suelo no interfieren en el desarrollo de los cultivos posteriores.



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



FUNGICIDA AGRÍCOLA
EMULSION CONCENTRADA (EC)
Registro Nacional ICA No. 1229
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



anasac
COLOMBIA

ESTRUENDO

COMPATIBILIDAD

ESTRUENDO EC es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas de uso común. No se debe mezclar con productos de reacción fuertemente alcalina. En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer pruebas de Fito compatibilidad.



**EN CASO DE INTOXICACIÓN,
COMUNÍQUESE CON CISPROQUIM:**
Línea 01 8000 916012 (fuera de Bogotá)
o en Bogotá al teléfono (601) 2886012.
Atención 24 horas.

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE
CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

PRESENTACIONES

1L

FITOTOXICIDAD

ESTRUENDO EC es totalmente selectivo a los cultivos recomendados, si se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso de esta etiqueta.



ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- No almacene ni transporte junto con alimentos, bebidas, ropa, agua o medicamentos de consumo humano o animal. Evite el contacto del producto con el fuego.
- Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA
CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA
GUARDAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y
ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS”
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES
VECES LOS EMPAQUES DESOCUPADOS Y VIERTA LA
SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO
INUTILÍCELOS O PERFÓRELOS PARA EVITAR SU
REUSO Y ELIMINE SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS
APROBADOS POR LA AUTORIDAD LOCAL.**

