



INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)
No. Registro Nacional ICA: 1750
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



Fakyr 93EC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO

Abamectina: 18 g/L Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 Litro
Bifentrina: 75 g/L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FAKYR 93 EC es un acaricida/insecticida con una mezcla innovadora, posee características físico químicas que le confieren una fase de vapor contundente y residualidad por distribución en los tejidos foliares.

Su doble mecanismo de acción genera en el insecto una alta concentración de elementos tóxicos y la pérdida de movilidad, por tanto, una rápida cesación de la alimentación.

TABLA DE USOS REGISTRADOS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C. (Días)	P.R. (Horas)
AGUACATE (<i>Persea americana</i>)	Ácaros (<i>Oligonychus yothersi</i>)	0.6 L/Ha	7	4*
LIMÓN (<i>Citrus limón</i>)	Ácaros (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	0.5 L/Ha	7	
ROSA (<i>Rosa sp.</i>)	Ácaros (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.5 cc/L	N.A.	4
CEBOLLA (<i>Allium cepa</i>)	Minador (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	0.4 L/Ha	7	

P.C. Periodo de carencia: Tiempo entre la última aplicación y la cosecha.

P.R. Periodo de reingreso: Periodo restringido (no prohibido) entre la aplicación y la reentrada del personal al área aplicada (ver tiempo en cuadro).

* Ingresar al cultivo dos (2) horas después de la última aplicación del plaguicida, con autorización previa del ingeniero agrónomo, verificando que el follaje esté seco y utilizando los elementos de protección indicados.



FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

FAKYR 93 EC debe ser aplicado con la dosis recomendado al momento en se observen los primeros individuos de la plaga a controlar.

FAKYR 93 EC puede ser incluido dentro de un programa de rotación para el control de plagas, la rotación a utilizar debe contemplar diferentes mecanismos y/o modos de acción para no generar resistencia de la plaga a los ingredientes activos de los productos a utilizar.

MODO DE APLICACIÓN

Para la preparación de la mezcla se recomienda llenar con agua el tanque del equipo a utilizar con la mitad del volumen, luego colocar el agitador en marcha y agregar la dosis requerida de **FAKYR 93 EC** hasta obtener una mezcla homogénea y estable, finalmente completar con agua hasta el volumen deseado.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)
No. Registro Nacional ICA: 1750
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



anasac
COLOMBIA

Fakyr 93EC

COMPATIBILIDAD



FAKYR 93 EC es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola, si es utilizado bajo las recomendaciones de la etiqueta, sin embargo, se recomienda antes de efectuar mezclas, realizar previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS

Los residuos del producto **FAKYR 93 EC** no afectan los cultivos siguientes dentro de una rotación, si se siguen las recomendaciones y se aplican las dosis de la etiqueta.



**EN CASO DE INTOXICACIÓN,
COMUNÍQUESE
CON CISPROQUIM:
Línea 01 8000 916012
(fuera de Bogotá)
o en Bogotá al teléfono
(601) 2886012. Atención 24 horas.**

**ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO
PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR
ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"
"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y
ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS"
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES
LOS EMPAQUES DESOCUPADOS Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN
LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELOS O
PERFÓRELOS PARA EVITAR SU REUSO Y ELIMINE
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA
AUTORIDAD LOCAL.**

PRESENTACIONES

250cc - 1L

FITOTOXICIDAD

FAKYR 93 EC es bien tolerado por los cultivos mencionados siempre y cuando se aplique acorde con las recomendaciones de uso.



EQUIPOS DE APLICACIÓN Y SU CALIBRACIÓN

FAKYR 93 EC Se puede aplicar con los equipos convencionales que existen regularmente en las fincas. Recuerde utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurar que la aplicación se realice uniformemente. Verificar la calibración de los equipos y recordar que esta se hace más crítica al disminuir el volumen de aguas empleado por hectáreas. Se aplica por aspersión foliar. Los equipos y los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- No almacene ni transporte junto con alimentos, bebidas, ropa, agua o medicamentos de consumo humano o animal. Evite el contacto del producto con el fuego.
- Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.

**"ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE
CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

