



INSECTICIDA AGRÍCOLA  
MICROEMULSION (ME) No.  
Registro Nacional ICA: PL0015622023  
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



# GOLPE® 5 ME

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### INGREDIENTE ACTIVO

Lambdacihalotrina.....50 g/L. Ingredientes aditivos: ..... c.s.p. 1 Litro

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**GOLPE® 5 ME**, es un insecticida perteneciente al grupo químico de los Piretroides, que actúa por contacto e ingestión y es altamente residual. Estimula las células nerviosas produciendo repetidas descargas y eventuales casos de parálisis. Estos efectos son causados por la acción en los canales de sodio, a través de los poros por donde se permite la entrada de axones para causar la sobrecitación, se producen cambios de permeabilidad en la membrana a nivel del axón a los iones Na<sup>+</sup> y K<sup>+</sup>. se genera hiper-exitación y posteriormente bloqueo del impulso eléctrico, parálisis, postración y la muerte del insecto.

### TABLA DE USOS REGISTRADOS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS*	P.C. (Días)	P.R. (Horas)
ARROZ	Gusano cogollero ( <i>Spodoptera frugiperda</i> )	0.15 – 0.2 L/Ha	14	4
PAPA	Pulguilla ( <i>Epitrix sp.</i> )	0.2 L/Ha	N.A.	4
ALGODÓN	Gusano cogollero ( <i>Spodoptera frugiperda</i> )	0.2 L/Ha	14	4
TOMATE, AJÍ, BERENJENA, LULO, PIMENTÓN, TOMATE DE ÁRBOL, UCHUVA	Perforador del fruto ( <i>Neoleucinodes elegantalis</i> )	0.2 L/Ha	N.A.	4
ORNAMENTALES (ROSA, CLAVEL, POMPÓN)	Thrips ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	1.5 cc/L	N.A.	4

P.C: Período de carencia; intervalo entre la última aplicación y la cosecha.  
P.R: Período de Reentrada; intervalo entre la última aplicación y el reingreso al área tratada.

### FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN



**Arroz:** Aplicar cuando se presenten 10 larvas por metro<sup>2</sup>, se recomienda la dosis más baja con primeros ataques de la plaga y la dosis alta cuando se presente más de 10 larvas/m<sup>2</sup> o cuando las condiciones ambientales favorezcan el ataque de la plaga.

**Papa:** Aplicar cuando se presente el umbral económico de 1 insecto/planta. Se sugiere no hacer más de dos aplicaciones sucesivas de este producto y alternar su uso con productos de diferentes mecanismos de acción.

**Algodón:** Hacer una aplicación cuando el 5% de las plantas presentes en un metro lineal se encuentren afectadas, si el insecto se presenta en estado vegetativo hasta botón o el 3% si el ataque se inicia en etapa de floración o cápsula.

**Tomate:** Hacer aplicaciones en época de floración, momento en el cual la plaga puede ser controlada dado que las larvas se encuentran expuestas.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II  
MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



INSECTICIDA AGRÍCOLA  
MICROEMULSION (ME) No.  
Registro Nacional ICA: PL0015622023  
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



# GOLPE® 5 ME

## EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

**GOLPE 5 ME**, puede ser aplicado con los equipos convencionales los cuales deben estar perfectamente calibrados para dar un óptimo rendimiento del producto sobre la plaga a tratar. Teniendo en cuenta que los tanques se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla.

## COMPATIBILIDAD

**GOLPE 5 ME** Es incompatible con productos fuertemente alcalinos. **GOLPE 5 ME** es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola, si es utilizado bajo las recomendaciones de la etiqueta, sin embargo, se recomienda antes de efectuar mezclas, realizar previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.



## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- “No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.
- Durante las aplicaciones terrestres “Utilice ropa protectora durante la manipulación, la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”; además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno o PVC, botas de caucho, gorra, gafas de protección y respirador especial para plaguicidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.
- “Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”. En caso de inhalación, lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.
- No re-usar la ropa de aplicación, ni el equipo de seguridad sin haber sido lavados previamente. “Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado”.

## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

La ingestión genera disminución de la capacidad respiratoria, fatiga, contracción de los músculos y calambres.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

## PREPARACION DE LA MEZCLA

**Aplicación aérea:** Llenar el tanque hasta la mitad del volumen total a utilizar, agregar la cantidad de **GOLPE 5 ME** requerida, agregar aceite en la dosis recomendada, como adherente y luego completar con agua hasta completar el volumen total. **Aplicación terrestre:** Llenar el tanque hasta la mitad del volumen total a utilizar, agregar la cantidad de **GOLPE 5 ME** requerida y luego completar con agua hasta completar el volumen total a aplicar.

## FITOTOXICIDAD

**GOLPE 5 ME** es bien tolerado por los cultivos mencionados siempre y cuando se aplique acorde con las recomendaciones de uso.



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”. “CORROSIVO, CAUSA DAÑO IRREVERSIBLE A LOS OJOS”. “EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA”. “EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS”.

## PRIMEROS AUXILIOS

- **Contacto con la piel y la ropa:** Quite la ropa y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón por 20 minutos.
- **Contacto con los ojos:** Lave inmediatamente los ojos contaminados con abundante agua durante 10 a 15 minutos. En caso de inhalación, el paciente debe trasladarse a un lugar aireado.

Si el producto se ha ingerido, induzca el vómito, administre agua al paciente para la dilución y rápida eliminación del producto (únicamente si la persona está consciente) hasta que el vómito sea claro.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II  
MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



INSECTICIDA AGRÍCOLA  
 MICROEMULSION (ME)No.  
 Registro Nacional ICA: PL0015622023  
 Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



# GOLPE® 5 ME

## ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO

No tiene antídoto específico. Suministre tratamiento sintomático y de recuperación general.



**EN CASO DE INTOXICACIÓN,  
 COMUNÍQUESE  
 CON CISPROQUIM:  
 Línea 01 8000 916012  
 (fuera de Bogotá)  
 o en Bogotá al teléfono  
 (601) 2886012. Atención 24 horas.**

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- No almacene ni transporte junto con alimentos, bebidas, ropa, agua o medicamentos de consumo humano o animal. Evite el contacto del producto con el fuego.
- Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.

## PRESENTACIONES

125gr - 500gr

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

