



FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
No. Registro Nacional ICA: PLO001842024
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO

Azoxystrobin..... 200 g/L
Tebuconazole125 g/L

Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 Litro

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

IMPERIO es un fungicida con acción sistémica y translaminar, preventivo y curativo. La acción combinada de sus ingredientes activos le permite actuar sobre una alta gama de hongos patógenos, en especial del orden Ascomycetos. El azoxystrobin es un methoxy-acrylato (derivado de las estrobirulinas) que posee actividad preventiva sistémica en una amplia gama de patógenos incluyendo oomycetos. Este impide la respiración fúngica en el complejo III; citocromo bc1, Ubiquinol -oxidasa, sitio Qo. El tebuconazol inhibe la biosíntesis de esteroides (ergosterol) en la desmetilación C14.

TABLA DE USOS REGISTRADOS

| CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO | DOSIS | P.C. (Días) | P.R. (Horas) |
|---|---|---------------------------------|-------------|--------------|
| ARROZ (<i>Oryza sativa</i> L.) | Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>) | 0.5 L/Ha | 35 | 4 |
| | Mancha parda (<i>Helminthosporium oryzae</i>) | 0.4 L/Ha | | |
| CLAVEL (<i>Dianthus caryophyllus</i>) | Mancha anillada (<i>Cladosporium echinulatum</i>) | 0.6 L/Ha (0.6 cc/L de agua) | N.A. | |
| TOMATE (<i>Lycopersicon esculentum</i>) | Alternaria (<i>Alternaria solani</i>) | 0.25 L/Ha | 7 | |
| CEBOLLA (<i>Allium cepa</i>) | Alternaria (<i>Alternaria porri</i>) | 0.3 L/Ha | 14 | |
| ROSA (<i>Rosa sp</i>) | Mildeo polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) | 1.5 L/Ha (1.25 cc/L de agua) | N.A. | |

P.C. Periodo de carencia: N.A. No aplica. P.R. Periodo de reingreso.



FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Aplicar **IMPERIO** en forma preventiva o con el comienzo de los primeros síntomas de la enfermedad a intervalos de 10 a 15 días. En cultivos de rosa realizar máximo tres (3) aplicaciones durante el ciclo del cultivo. Realizar las aspersiones dirigidas al patio de infección. Intercalar con fungicidas de diferente modo de acción.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
No. Registro Nacional ICA: PLO001842024
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



MODO DE APLICACIÓN

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que se va a utilizar, agregar la dosis requerida de **IMPERIO** luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS

No afecta los cultivos siguientes dentro de una rotación si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD



No recomendable mezclar con otro plaguicida o fertilizante. La compañía no se responsabiliza por mezclas no recomendadas en esta etiqueta.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

IMPERIO se puede aplicar con los equipos convencionales. Para óptima distribución, utilizar boquillas de cono hueco y aplicar un volumen de 1200 litros de agua por hectárea. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para las plantas si se siguen las instrucciones de uso.



ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

No almacene ni transporte junto con alimentos, bebidas, ropa, agua o medicamentos de consumo humano o animal. Evite el contacto del producto con el fuego.

Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.



**EN CASO DE INTOXICACIÓN,
COMUNÍQUESE CON CISPROQUIM:
Línea 01 8000 916012
(fuera de Bogotá)
o en Bogotá al teléfono (601) 2886012.
Atención 24 horas.**

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE
CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO
PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR
ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y
ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS”
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES
LOS EMPAQUES DESOCUPADOS Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN
LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELOS O
PERFÓRELOS PARA EVITAR SU REUSO Y ELIMINE
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA
AUTORIDAD LOCAL.**

PRESENTACIONES

250cc - 1L - 4L - 20L

