



FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)
No. REGISTRO NACIONAL ICA: PL0015152023
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



MOXAN® MZWP

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO

Cymoxanil: 80 gr/kg.

Mancozeb: 640 gr/kg.

Ingredientes aditivos:.....c.s.p. 1 Kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MOXAN MZ WP, es un fungicida formulado como una mezcla de dos ingredientes activos diferentes: una parte protectante como es el “MANCOZEB” y otra sistémica curativa como es el “CYMOXANIL”. Esto le confiere un doble modo de acción: protectante o preventivo y sistémico curativo, siendo más eficiente en el manejo de las enfermedades.

MOXAN MZ WP, posee una acción preventiva y de post-infección, cuando el hongo está en incubación. Además posee actividad sistémica local, lo cual mejora su efecto, especialmente en periodos de alta presión de la enfermedad.

TABLA DE USOS REGISTRADOS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS*	P.C. (Días)	P.R. (Horas)
PAPA	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	2 kg/Ha	7 días	4
ORNAMENTALES (Rosa, Clavel, Pompón)	Mildeo vellos (<i>Peronospora sparsa</i>)	3 kg/Ha (2.5 g/l)	N.A.	
<p>P.C. (Periodo de carencia): Días entre la última aplicación y la cosecha. P.R. (Periodo de reentrada): horas para ingresar al área tratada sin equipo de protección personal.</p>				



FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

La dosis y frecuencia de aplicación dependen del clima, del grado de infestación de la enfermedad y del estado de desarrollo del cultivo. Se aplica a campo abierto, evitando aplicar con lluvias y vientos fuertes.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Disuelva completamente la cantidad de **MOXAN MZ WP** a usar en un balde y luego deposítelo en el tanque de la mezcla, el cual debe contener agua hasta $\frac{3}{4}$ o la mitad de su capacidad. Complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

MOXAN MZ WP se puede aplicar con los equipos convencionales, los tanques se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto. Asegúrese que la aplicación se realice uniformemente. Verifique la calibración de los equipos y recuerde que ésta se hace más crítica al disminuir el volumen empleado por hectárea. Su forma de empleo es en aspersión foliar.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)
No. REGISTRO NACIONAL ICA: PL0015152023
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



MOXAN® MZWP

COMPATIBILIDAD



MOXAN MZ XP no es compatible con productos fuertemente alcalinos.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.
- Quite la ropa y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón por 20 minutos.
- Lave inmediatamente los ojos contaminados con agua pura durante 10 a 15 minutos.
- En caso de inhalación, el paciente debe trasladarse a un lugar aireado.
- Si el producto se ha ingerido, enjuagar la boca con agua. No inducir el vómito.



**EN CASO DE INTOXICACIÓN,
COMUNÍQUESE CON CISPROQUIM:
Línea 01 8000 916012 (fuera de Bogotá)
o en Bogotá al teléfono (601) 2886012.
Atención 24 horas.**

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE
CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

FITOTOXICIDAD

MOXAN MZ WP ha mostrado seguridad ya que no ha mostrado síntomas de fototoxicidad en el cultivo, si se siguen las indicaciones y la dosis recomendada.

GUÍA PARA EL MÉDICO

- Síntomas de intoxicación: La ingestión genera diarrea, náusea y vómito. La inhalación genera dolor de cabeza, mareo, dificultad para respirar y tos. El contacto con la piel y los ojos genera enrojecimiento, dermatitis y dolor. Otros: Nerviosismo, vértigo, visión borrosa, calambres y molestia en el pecho.
- Tratamiento: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático.
- Contraindicaciones: Alcohol.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- No almacene ni transporte junto con alimentos, bebidas, ropa, agua o medicamentos de consumo humano o animal. Evite el contacto del producto con el fuego.
- Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO
PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR
ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y
ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS”
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES
VECES LOS EMPAQUES DESOCUPADOS Y VIERTA LA
SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO
INUTILÍCELOS O PERFÓRELOS PARA EVITAR SU REUSO Y
ELIMINE SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS
POR LA AUTORIDAD LOCAL.**

PRESENTACIONES

500 gr

