



FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
No. Registro Nacional ICA: PL0016352023
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



anasac
COLOMBIA

PATAGONIA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO

Pyrimethanil:400 g/ L

Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 Litro

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PATAGONIA SC es un fungicida preventivo y curativo, con acción por contacto y translaminar que impide la extensión del tubo germinativo del hongo, por lo que detiene su penetración en las células epidérmicas de la planta, impidiendo la secreción de proteínas del patógeno necesarias para el proceso de infección, al tiempo que reduce los contenidos de algunas enzimas hidrolíticas que participan en la penetración y necrosis de los tejidos afectados.

PATAGONIA SC es ideal para el manejo de hongos Ascomycetos, se recomienda hacer rotaciones con productos de diferente mecanismo y/o modo de acción.

TABLA DE USOS REGISTRADOS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS*	P.C. (Días)	P.R. (Horas)
ROSA	Mildeo Polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	1,5 L/Ha	N.A.	12
BANANO	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0,75 L/Ha	0	4*
FRESA	Modo gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,5 L/Ha	3	4
ARANDANO ALTO (<i>Vaccinium corymbosum</i>) ARANDANO OJO DE CONEJO (<i>Vaccinium ashei</i>) ARANDANO CRANBERRY (<i>Vaccinium macrocarpon</i>)	Modo gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,5 L/Ha	3	4
TOMATE	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,75 L/Ha	3	4

P.C: Período de Carencia (Días). P.R: Período de reentrada (Horas). N.A: No aplica

* Dosis / Ha promedio, para un volumen de aplicación de 1000 L / Ha realizando una previa calibración del equipo de fumigación.

**Ingresar al cultivo dos (2) horas después de la última aplicación del plaguicida, con autorización previa del ingeniero agrónomo, verificando que el follaje esté seco y utilizando los elementos de protección indicados.

FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN



PATAGONIA SC se recomienda la aplicación del producto con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar como máximo 3 aplicaciones por temporada, con un intervalo mínimo de 7 días entre una aplicación y otra. Se recomienda la rotación del producto con otros de diferente grupo químico.

MODO DE APLICACIÓN

Para la preparación de la mezcla se recomienda llenar con agua el tanque del equipo a utilizar con la mitad del volumen, luego colocar el agitador en marcha y agregar la dosis requerida de **PATAGONIA SC** hasta obtener una mezcla homogénea y estable, finalmente completar con agua hasta el volumen deseado.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
No. Registro Nacional ICA: PL0016352023
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



anasac
COLOMBIA

PATAGONIA

EFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS

En diferentes estudios de campo, se ha demostrado que los residuos presentes en el suelo no interfieren en el desarrollo de los cultivos posteriores.

COMPATIBILIDAD



PATAGONIA SC es incompatible con productos que contengan aluminio. En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer pruebas de Fito compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

PATAGONIA SC No es fitotóxico si se utiliza siguiendo todas las recomendaciones de esta etiqueta.



EQUIPOS DE APLICACIÓN Y SU CALIBRACIÓN

PATAGONIA SC se puede aplicar con los equipos convencionales que existen regularmente en las fincas. Recuerde utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurar que la aplicación se realice uniformemente. Verificar la calibración de los equipos y recordar que esta se hace más crítica al disminuir el volumen de aguas empleado por hectáreas. Se aplica por aspersion foliar. Los equipos y los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto.



**EN CASO DE INTOXICACIÓN,
COMUNÍQUESE CON CISPROQUIM:
Línea 01 8000 916012 (fuera de Bogotá)
o en Bogotá al teléfono (601) 2886012.
Atención 24 horas.**

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- No almacene ni transporte junto con alimentos, bebidas, ropa, agua o medicamentos de consumo humano o animal. Evite el contacto del producto con el fuego.
- Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.

**ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO
PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR
ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"
"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y
ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS"
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES
LOS EMPAQUES DESOCUPADOS Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN
LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELOS O
PERFÓRELOS PARA EVITAR SU REUSO Y ELIMINE
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA
AUTORIDAD LOCAL.**

**"ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE
CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

PRESENTACIONES

250cc - 1L

