



HERBICIDA AGRÍCOLA  
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)  
No. Registro Nacional ICA: PL0014942023  
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



**anasac**  
COLOMBIA

# TRAUCO

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### INGREDIENTE ACTIVO

Oxifluorfen:.....240 g/L

Ingredientes aditivos: .....c.s.p 1 Litro.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**TRAUCO @ 24 EC** es un herbicida pre-emergente recomendado en el control de malezas gramíneas, ciperáceas y hojas anchas, posee un largo efecto residual que permite mantener el cultivo limpio durante el periodo crítico de competencia de malezas. Puede así mismo aplicarse en post-emergencia temprana según lo indicado en la etiqueta para cada cultivo en particular. Actúa en la Inhibición del protoporfirinógeno oxidasa (PPO). La protoporfirinógeno oxidasa (PPO) es una enzima de los cloroplastos, la cual oxida al protoporfirinógeno para producir protoporfirina IX. Este producto es importante ya que es la molécula precursora de las clorofilas (necesarias para la fotosíntesis) y los grupos hemo (necesarios en las cadenas de transferencia de electrones).

### TABLA DE USOS REGISTRADOS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C. (Días)	P.R. (Horas)
CEBOLLA ( <i>Allium cepa</i> )	Avena loca ( <i>Avena fatua</i> ) Gramalote ( <i>Paspalum fsciculatum</i> ) Granadilla ( <i>Paspalum paniculatum</i> ) Pasto kikuyo ( <i>Penisetum clasdestinum</i> ) Pasto micay ( <i>Axonoplus micay</i> ) Pasto para ( <i>Brachiaria mutica</i> ) Pasto raygras ( <i>Lolium perenne</i> ) Diente de leon ( <i>Taraxacum officinale</i> ) Trébol Blanco ( <i>Trifolium repens</i> ) Lengua de vaca ( <i>Rumex c.</i> )	1,5 L/Ha	45	0
ARROZ ( <i>Oryza sativa</i> )	Liendrepuereco ( <i>Echinochloa colonum</i> ) Falsa caminadora ( <i>Ischaemun rugosum</i> ) Caminadora ( <i>Rotboelia cochichinensis</i> ) Guardarocio ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pata de gallina ( <i>Eleusine indica</i> ) Paja mona ( <i>Leptochloa filiformis</i> ) Paja peluda ( <i>Paspalum piulosum</i> )		N.A.	

P.C.: Período de carencia - P.R.: Período de re-entrada



### FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

**TRAUCO @ 24 EC** Se recomienda aplicarlo después de 5 días de efectuado el transplante o deshije (cebolla de rama) en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malezas.

**TRAUCO @ 24 EC** se aplica generalmente una vez por temporada de cultivo, sin embargo, es factible repetir el tratamiento cada vez que exista una nueva emergencia de malezas desde el suelo.

### EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS

En diferentes estudios de campo, se ha demostrado que los residuos presentes en el suelo no interfieren en el desarrollo de los cultivos posteriores.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III  
LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



HERBICIDA AGRÍCOLA  
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)  
No. Registro Nacional ICA: PL0014942023  
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



# TRAUCO

## COMPATIBILIDAD

En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer pruebas de fitocompatibilidad.



## FITOTOXICIDAD

En cebolla de rama ocasiona quemazón apical de las hojas con posterior recuperación total, sin observarse efecto negativo en su desarrollo. No aplicar en cebolla para semilla.

## PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela esta etiqueta.
- Si contacta la piel, quite la ropa y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón por 20 minutos.
- Si contacta los ojos, lave inmediatamente con agua pura durante 10 a 15 minutos.
- Si se inhala, lleve al paciente a un lugar con aire fresco, suministrando respiración artificial de ser necesario.
- Si se ingiere, no induzca el vómito si no tiene supervisión médica.

## Síntomas de intoxicación

Posibilidad de irritación ocular y cutánea con descamación de la piel. Irritación de la mucosa del sistema respiratorio, tos, dolor abdominal, salivación, náusea y vómito.

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

## PRESENTACIONES

1L - 20L

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.



**EN CASO DE INTOXICACIÓN,  
COMUNÍQUESE CON CISPROQUIM:  
Línea 01 8000 916012 (fuera de Bogotá)  
o en Bogotá al teléfono (601) 2886012.  
Atención 24 horas.**

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- No almacene ni transporte junto con alimentos, bebidas, ropa, agua o medicamentos de consumo humano o animal. Evite el contacto del producto con el fuego.
- Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”**  
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS”  
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES LOS EMPAQUES DESOCUPADOS Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELOS O PERFÓRELOS PARA EVITAR SU REUSO Y ELIMINE SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD LOCAL.

