



HERBICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)
Registro Nacional ICA No. PL0014942023
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



anasac
COLOMBIA

TRAUCO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO

Oxifluorfen:.....240 g/L

Ingredientes aditivos: c.s.p 1 Litro.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TRAUCO® 24 EC es un herbicida pre-emergente recomendado en el control de malezas gramíneas, ciperáceas y hojas anchas, posee un largo efecto residual que permite mantener el cultivo limpio durante el periodo crítico de competencia de malezas. Puede así mismo aplicarse en post-emergencia temprana según lo indicado en la etiqueta para cada cultivo en particular. Actúa en la Inhibición del protoporfirinógeno oxidasa (PPO). La protoporfirinógeno oxidasa (PPO) es una enzima de los cloroplastos, la cual oxida al protoporfirinógeno para producir protoporfirina IX. Este producto es importante ya que es la molécula precursora de las clorofilas (necesarias para la fotosíntesis) y los grupos hemo (necesarios en las cadenas de transferencia de electrones).

TABLA DE USOS REGISTRADOS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C. (Días)	P.R. (Horas)
CEBOLLA (<i>Allium cepa</i>)	Pasto kikuyo (<i>Penisetum claudatum</i>) Pasto raigrass (<i>Lolium perenne</i>) Diente de león (<i>Taraxacum officinale</i>) Trébol Blanco (<i>Trifolium repens</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex c.</i>)	1.5 L/Ha	45	0
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	Liendrepueco (<i>Echinochloa colonum</i>) Falsa caminadora (<i>Ischaemum rugosum</i>) Caminadora (<i>Rotboelia cochichinensis</i>) Guardarocio (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>) Paja mona (<i>Leptochloa filiformis</i>) Paja peluda (<i>Paspalum piulosum</i>)		N.A.	

P.C.: Período de carencia - P.R.: Período de re-entrada



FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

TRAUCO® 24 EC Se recomienda aplicarlo después de 5 días de efectuado el transplante o deshije (cebolla de rama) en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malezas.

TRAUCO® 24 EC se aplica generalmente una vez por temporada de cultivo, sin embargo, es factible repetir el tratamiento cada vez que exista una nueva emergencia de malezas desde el suelo.

EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS

En diferentes estudios de campo, se ha demostrado que los residuos presentes en el suelo no interfieren en el desarrollo de los cultivos posteriores.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



HERBICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)
Registro Nacional ICA No. PL0014942023
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



anasac
COLOMBIA

TRAUCO

COMPATIBILIDAD

En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer pruebas de fitocompatibilidad.



FITOTOXICIDAD

En cebolla de rama ocasiona quemazón apical de las hojas con posterior recuperación total, sin observarse efecto negativo en su desarrollo. No aplicar en cebolla para semilla.

PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con la piel y la ropa: Quite la ropa y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón por 20 minutos.
- Contacto con los ojos: Lave inmediatamente los ojos contaminados con abundante agua durante 10 a 15 minutos.
- En caso de inhalación, el paciente debe trasladarse a un lugar aireado.
- Si el producto se ha ingerido, induzca el vómito, administre agua al paciente para la dilución y rápida eliminación del producto (únicamente si la persona esta consciente) hasta que el vómito sea claro. En todo caso lleve el paciente al médico y muéstrela una copia de la etiqueta.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

Posibilidad de irritación ocular y cutánea con descamación de la piel. Irritación de la mucosa del sistema respiratorio, tos, dolor abdominal, salivación, náusea y vómito.

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

PRESENTACIONES

1L - 20L

**EN CASO DE INTOXICACIÓN,
COMUNÍQUESE CON CISPROMQUIM:**
Línea 01 8000 916012 (fuera de Bogotá)
o en Bogotá al teléfono (601) 2886012.
Atención 24 horas.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- No almacene ni transporte junto con alimentos, bebidas, ropa, agua o medicamentos de consumo humano o animal. Evite el contacto del producto con el fuego.
- Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO
PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR
ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”**

**“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y
ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS”**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES
LOS EMPAQUES DESOCUPADOS Y VIERTA LA SOLUCIÓN
EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELOS O
PERFÓRELOS PARA EVITAR SU REUSO Y ELIMINE
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA
AUTORIDAD LOCAL.**

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

